

沖縄の熱帯果樹や温帯果樹、柑橘類に

有機 706

ナナ

マル

ロク

7-10-6

チッソ

リンサン

カリ



 **良質な有機肥料を配合しています。**



■ 供給  JAおきなわ

■ 製造

 琉球肥料株式会社

■ 保証成分 (%)

チツソ		リンサン			カリ	
全量	内アンモニア性	全量	内ク溶性	内水溶性	全量	内水溶性
7	4.9	10	5.6	3.8	6	5.5

■ 特長

1. この肥料は蒸製骨粉25%、なたね油粕25%、配合しています。
2. 有機質の緩効性効果とともに早効きの肥料効果もあることから収穫後のお礼肥として樹勢回復に効果を発揮します。

■ 使い方

パパイヤ	1年目	基肥	植付2ヶ月後	植付5ヶ月後	植付8ヶ月後	植付10ヶ月後
		220g	340g	560g	560g	560g
	2年目以降	3月	6月下旬	8月下旬	10月下旬	1株あたりの施肥量です。
		1000g	680g	680g	1000g	

タンカン (結果樹)	目標反収	2月中旬	5月上旬	9月上旬	11月上旬	10アール(300坪)での施肥量です。
	1~2t	90~110kg	60~70kg	90~110kg	60~70kg	
	3t	130kg	85kg	130kg	85kg	

シークワサー	結果樹	2月	5月	8月	10月	10アール(300坪)での施肥量です。
		75kg	75kg	75kg	75kg	

パッションフルーツ	目標反収	生長期	開花盛期	果実肥大期	10アール(300坪)での施肥量です。
	2t	84kg	84kg	112kg	

スターフルーツ	成木 (樹形完成)	1月	3月	6月	8月	9~10月
		600g	900g	300g	600g	600g

※1株あたりの施肥量です。

グアバ (結果樹)	5年木以上	春枝発芽前	開花終了後	果実肥大期	収穫後	1株あたりの施肥量です。
		800g	800g	900g	900g	
	10年木以上	春枝発芽前	開花終了後	果実肥大期	収穫後	40~50株/10アールとして。
		1400g	1400g	1500g	1500g	

ビワ	樹齢	12月中旬~下旬	3月中旬~下旬	5月上旬~中旬	9月上旬~中旬	10アール(300坪)での施肥量です。 100株/10アールとして。
	3年	47kg	31kg	31kg	47kg	
	4年	60kg	40kg	40kg	60kg	
	5年	90kg	60kg	60kg	90kg	
	6年	103kg	68kg	68kg	103kg	
	目標10t	133kg	89kg	89kg	133kg	

スモモ (結果樹)	土質	2月下旬	6月中旬	9月中旬	10アール(300坪)での施肥量です。
	粘土質	35~45kg	35~45kg	100~140kg	
	※目標1~2t	砂礫質	45~60kg	45~60kg	140~170kg

これらの施肥量は、沖縄県の施肥基準、また農家慣行を元にしてあります。作型や土壌の種類などにより適宜増減してください。